QFL 2345 – 2011 - EXERCÍCIOS 7

J. WILHELM BAADER

1. Nas reações do tipo Wagner-Meerwein (migração para um C deficiente em elétrons) a facilidade de migração de diversos grupos é a seguinte:

Ar > alquil > H; *t*-Bu > *i*-prop. > etil > metil > H

p-CH₃OC₆H₄ > *p*-CH₃C₆H₅ > C₆H₅ > *p*-ClC₆H₄ > *o*-CH₃OC₆H₄

a) Explique estas ordens de reatividade mostrando o mecanismo (estado de transição).

b) Discuta a maior facilidade de migração de grupos aril comparada com grupos alquil, apesar de que o cátion C₆H₅⁺ (estrutura eletrônica?) é menos estável de que cátions alquila.

c) Descreva um experimento através do qual será possível determinar a facilidade de migração de diferentes grupos.

2. Rearranjos 1,2 de carbocátions intermediários ocorrem com muita facilidade em sistemas bicíclicos:

a) α -Pineno (1) e β -pineno (2) tratados com HCl acima de 0°C sofrem rearranjo, levando ao cloreto de bornila (3) em ambos os casos. Mostre o mecanismo. Por que ocorre, neste caso, um rearranjo de um carbocátion terciário para um secundário?

b) Cloreto de bornila (3) e cloreto de isobornila (4), tratados com NaOH diluído, levam a formação de canfeno (5). Dê o mecanismo.

3. No rearranjo pinacólico, como na maior parte dos rearranjos para átomos deficientes em elétrons, sabe-se que a saída do grupo de partida (no caso água) e a migração ocorrem de maneira concertada. Tendo isso em vista, explique as seguintes observações experimentais, formulando os mecanismos com fórmulas estereo-químicas: *cis*-1,2-dimetilciclo-hexano-1,2-diol tratado com ácido fornece 2,2-dimetilciclo-hexanona, entretanto, o isômero *trans* fornece 1-acetil-1-metilciclopentano.

4. Explique as seguintes transformações:

QFL 2345 – 2011 - EXERCÍCIOS 7

J. WILHELM BAADER

5. O rearranjo de Beckmann (1887) (a conversão de uma oxima em uma amida substituída no nitrogênio) ocorre normalmente catalisado por ácido. Sabe-se que, em oximas substituídas não simetricamente, o grupo em posição **anti** migra.

a) Mostre o mecanismo do rearranjo de Beckmann escolhendo um exemplo adequado.

b) Explique porque 2,4,6-trinitrofenil éteres de oximas mostram rearranjo sem a necessidade de catálise ácida.

c) A cinética do rearranjo da oxima abaixo foi estudada com vários substituintes Y, obtendo-se um valor de $\rho = -1,1$. Quais conclusões podem ser tiradas com respeito ao mecanismo (passo limitante e estado de transição)?

d) A configuração do grupo migrante é mantida (retenção). Isto está de acordo com o mecanismo colocado em (a) e (c)?

e) O rearranjo, executado em água pesada (H_2O^{18}) mostra a incorporação de O^{18} no produto. Comente com respeito ao mecanismo.

6. A oxidação de Baeyer-Villiger (1899), conversão de cetonas com perácidos para ésteres, envolve uma migração 1,2 para um átomo de oxigênio deficiente em elétrons. Formule o mecanismo geralmente aceito para esta reação.

A seguir são dados alguns resultados específicos que contribuíram para estabelecer o mecanismo. Discuta estes resultados e as suas implicações mecanísticas.

X=	CH ₃ O	CH ₃	H	Cl	CN
k_{12}/k_{14}	0.998	1.032	1.048	1.050	1.084

Qual conclusão pode-se tirar com respeito ao passo limitante?

(iii) A oxidação de benzofenonas substituídas com ácido trifluoroperacético mostra um gráfico de Hammett linear com $\rho = -1,45$.

(*Passo limitante, estado de transição?*)

(iv) A oxidação de ciclo-hexanona com ácido trifluoroperacético ocorre 200 vezes mais rápido do que com ácido peracético. (*Passo limitante?*)